

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

**BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES**

DLP 30-6-72 414694

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION DES PAYS DE LA LOIRE ANGERS

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, VENDEE, MAYENNE)

Régisseur de recettes de la D. D. A. - Protection des Végétaux - Cité Administrative, rue Dupetit-Thouars - ANGERS

C. C. P. Nantes 86-04-02 49043 ANGERS-CEDEX

Tél. 88-30-34

88-06-15

Poste 571

ABONNEMENT ANNUEL

25frs

SUPPLEMENT N° 3 au BULLETIN N° 141 de JUIN 1972	-MAINE & LOIRE - LOIRE ATLANTIQUE..	p.32
	MAYENNE.....	p.30
SUPPLEMENT N° 3 au BULLETIN N° 141 de JUIN 1972	- SARTHE - VENDEE.....	p.29

MILDIOU -

VIGNE

- Vignobles de la Loire Atlantique et de muscadet de Maine et Loire - Les taches apparues vers le 15 juin et localement très nombreuses, sont pour la plupart fertiles. Quelques nouvelles taches, rares, sont apparues. D'autre part, le mildiou de la grappe a été observé. En conséquence, effectuer dès réception un nouveau traitement. Il est rappelé qu'à la veille de la floraison, les grappes doivent être parfaitement protégées et que ce traitement doit donc être particulièrement soigné.
Etant donnée la situation, tout traitement éliminé par la pluie dans ces vignobles, doit être renouvelé dans les meilleurs délais, sans attendre des informations de la Station.
- Vignobles des coteaux de la Loire limitrophes de la Loire Atlantique - Le mildiou peut s'y étendre rapidement. En conséquence, effectuer un nouveau traitement..
- Autres vignobles de Maine et Loire, y compris celui du Saumurois et vignobles des autres départements - Le mildiou demeure peu virulent et les taches sont extrêmement rares. Toutefois, la végétation s'est considérablement accrue depuis le dernier traitement et à la veille de la floraison, il y a lieu d'effectuer une nouvelle application dans le courant de cette semaine.

OIDIUM - Les conditions climatiques sont très favorables et l'on rencontre fréquemment la maladie à l'état latent, sur les cépages sensibles. Il y a donc lieu de se méfier de cette affection. En conséquence, on pourra profiter du traitement dirigé contre le mildiou pour assurer la protection contre l'oïdium et de la floraison pour effectuer un poudrage.

VERS DE LA GRAPPE -

- Vignobles de la Loire Atlantique et de muscadet de Maine et Loire - L'activité des vers de la grappe a été en général faible et considérablement allongée par les conditions climatiques défavorables. Cependant, dans certaines expositions, en particulier des coteaux de la Loire, on constate l'apparition des premières chenilles. Il n'est donc pas conseillé d'effectuer un traitement généralisé, mais d'observer les premières manifestations, actuellement parfaitement visibles et d'intervenir en cas de nécessité. La surveillance de l'apparition de ces manifestations devra se faire jusqu'au début de juillet, des pontes ayant été déposées tardivement.
- Vignobles de Maine et Loire (sauf le vignoble du Saumurois et du Haut Layon pour lesquels des informations ont été données dans la note du 14 juin), et autres vignobles - L'évolution de la cochyliis et de l'eudémis a été considérablement perturbée par les conditions climatiques défavorables et dans de nombreux vignobles, les pontes sont inexistantes. Toutefois, dès maintenant on peut noter localement l'apparition des premières chenilles. Il n'y a pas lieu d'effectuer un traitement généralisé. Il ne faut intervenir que dans les parcelles où elles sont visibles. Des pontes d'eudémis, en particulier sur les coteaux du Layon, ayant été déposées récemment, la surveillance devra donc être poursuivie jusqu'au début de juillet.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POIRES ET DES POMMES - Dans les vergers du Nord de la Loire Atlantique, les premiers oeufs vont arriver prochainement à éclosion. Il y a donc lieu d'effectuer un premier traitement dans les derniers jours de la semaine en cours.

MAINE et LOIRE - LOIRE ATLANTIQUE.....	p. 33
MAYENNE.....	p. 31
SARTHE - VENDEE.....	p. 30

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER - Dans le Nord de la Loire Atlantique, les projections d'ascospores sont pratiquement terminées, mais des taches doivent encore apparaître dans les derniers jours du mois. Il est donc conseillé d'ajouter un fongicide à la bouillie anti-tavelure.

OLDIUM DU POMMIER - Cette affection demeure virulente et la protection doit continuer d'être assurée dans le Nord de la Loire Atlantique.

POMME DE TERRE

MILDIU - Le mildiou s'étend actuellement dans le Nord du département de la Mayenne. Il peut rencontrer également dans d'autres régions des conditions favorables. En conséquence, dans les autres cultures du département de la Loire Atlantique situées au Nord de la Loire, dans l'ensemble des départements de la Mayenne et de la Sarthe, il y a lieu d'effectuer un traitement.

Dans les autres régions, il n'y a pas encore lieu d'intervenir.

CULTURES LEGUMIERES

TEIGNE DU POIREAU - Le deuxième vol est commencé depuis quelque temps et les premiers oeufs sont éclos. Il y a donc lieu d'effectuer un traitement dès réception de cette note, dans le département de Maine et Loire.

Ajouter un mouillant à la bouillie et pulvériser copieusement le feuillage.

Le Chef de la Circonscription
Phytosanitaire "Pays de la Loire"

J. DIXMERAS

Les Ingénieurs chargés des Avertissements Agricoles:

R. GEOFFRION - J. BOUCHET

TIRAGE DU 26 JUIN 1972